

患者监测检查清单

使用此图表可帮助您的患者留意并报告潜在的副作用

✍ 治疗前，请写下您的感觉，以记录基线。

✍ 治疗开始后，使用这张图表帮助您在肿瘤诊所访视间隔期内继续监测自身状况。

✍ 如果您注意到任何不适或出现任何状况变化，请立即联系“肿瘤科医疗团队”。

患者姓名	医生或护士的姓名	日期
------	----------	----

心脏:

- 新发胸痛或胸痛加重
- 心律不齐或感觉心跳加速
- 呼吸短促
- 疲劳
- 脚踝肿胀

肝脏:

- 皮肤或眼白发黄
- 严重恶心或呕吐
- 胃部（腹部）右侧疼痛
- 尿色深（茶色）
- 比平常更容易发生出血或产生淤青

肠道:

- 腹泻（稀便）或排便比平常频繁
- 大便呈黑色、柏油状、粘稠或带血或黏液
- 胃部（腹部）剧烈疼痛或压痛

其他器官:

其他器官和组织也可能出现问题。这些并不是使用 OPDIVO、YERVOY 或 Opdualag 时可能出现的免疫系统问题的所有体征和症状。如果出现任何新的或恶化的体征或症状，请立即致电或联系您的医护人员，这些体征或症状可能包括：

- 胸痛、心律不齐、呼吸短促或脚踝肿胀
- 复视、视力模糊、畏光、眼睛疼痛、视力变化
- 思维混乱、嗜睡、记忆问题、情绪或行为变化、脖子僵硬、平衡问题、四肢刺痛或麻木
- 持续性或严重的肌肉疼痛或无力、肌肉痉挛
- 红细胞减少、淤青

YERVOY (ipilimumab) 可能导致眼睛问题，其体征和症状包括 视力模糊、复视或其他视力问题以及眼睛疼痛或发红。

激素分泌腺:

- 持续性或异常头痛
- 眼睛畏光
- 眼睛问题
- 心率快
- 多汗
- 极度疲劳
- 体重增加或减轻
- 感觉比平常更容易饥饿或口渴
- 排尿比平常更频繁
- 脱发
- 感觉发冷
- 便秘
- 声音变得深沉
- 头晕或昏厥
- 情绪或行为改变，例如性欲减退、易怒或健忘

肺部:

- 新发咳嗽或咳嗽加重
- 胸痛
- 呼吸短促

肾脏:

- 尿量减少
- 尿中带血
- 脚踝肿胀
- 食欲减退

皮肤:

- 皮疹
- 瘙痒
- 皮肤起水泡或脱皮
- 口腔、鼻部、喉咙或生殖器官部位疼痛或溃疡

严重的输液反应:

- 寒颤或颤抖
- 呼吸短促或喘息
- 感觉要昏倒
- 瘙痒或皮疹
- 头晕
- 发热
- 潮红
- 背部或颈部疼痛

如果您正在接受 OPDIVO® (nivolumab) 与另一种药物联合用药，请就另一种药物的潜在副作用咨询医护人员。

使用供体干细胞（同种异体）进行骨髓（干细胞）移植的并发症，包括移植植物抗宿主病（GVHD）。

此类并发症可能较为严重，并可导致死亡。如果您在接受 OPDIVO、OPDIVO + YERVOY® (ipilimumab)、YERVOY 或 Opdualag™

(nivolumab and relatlimab-rmbw) 治疗之前或之后进行移植，可能会发生这些并发症。

您的医护人员将监测您是否出现这些并发症。

以上这些并非 OPDIVO、OPDIVO + YERVOY、YERVOY 或 Opdualag 可能会产生的全部副作用。

i 请参阅第 2-5 页上的“有关 OPDIVO、YERVOY 和 Opdualag 的重要安全信息”，以及“针对 OPDIVO、YERVOY 和 Opdualag 的美国完整处方信息和用药指南”。



适应症

OPDIVO® (nivolumab) 和 OPDIVO® + YERVOY® (ipilimumab)

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，用于治疗患有的一种称为黑色素瘤且已扩散或无法通过手术切除的皮肤癌（晚期黑色素瘤）的成年人和年满 12 岁的儿童患者。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，与 YERVOY® (ipilimumab) 联合用药可用于治疗患有的一种称为黑色素瘤且已扩散或无法通过手术切除的皮肤癌（晚期黑色素瘤）的成年人和年满 12 岁的儿童患者。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，可用于治疗一种称为黑色素瘤的皮肤癌。它可以单独用于患有 IIB 期、IIC 期、III 期或 IV 期黑色素瘤的成年人和年满 12 岁的儿童患者，有助于防止黑色素瘤在通过手术完全切除后复发。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，可联合包含铂类和其他化疗药物的化疗用药，在手术前治疗患有早期肺癌（称为非小细胞肺癌）的成年人。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，可与 YERVOY® (ipilimumab) 联合用药，作为首选治疗方法用于治疗患有的一种晚期肺癌（称为非小细胞肺癌）的成年人，此时患者的肺癌已扩散至身体其他部位（转移性），且肿瘤 PD-L1 为阳性，但没有异常的 EGFR 或 ALK 基因。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，可与 YERVOY® (ipilimumab) 一起同时联合包含铂类和其他化疗药物的 2 个周期化疗用药，作为首选治疗方法用于治疗患有的一种晚期肺癌（称为非小细胞肺癌）的成年人，此时患者的肺癌已扩散、生长或复发，但肿瘤没有异常的 EGFR 或 ALK 基因。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，用于治疗患有的一种已经扩散或增长的晚期肺癌（称为非小细胞肺癌）的成年患者，且这些患者已尝试过铂类药物化疗，然而它却不起作用或不再起作用。如果您的肿瘤带有异常的 EGFR 或 ALK 基因，您应当还尝试过经 FDA 批准的一种针对携带这些异常基因的肿瘤疗法，且它却不起作用或不再起作用。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，可与 YERVOY® (ipilimumab) 联合用药，作为首选治疗方法用于治疗患有的一种影响肺和胸壁内膜的癌症的成年人，此癌症称为恶性胸膜间皮瘤，无法通过手术切除。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，可与 YERVOY® (ipilimumab) 联合用药，用于治疗某些癌症（晚期肾细胞癌）已经扩散且尚未接受晚期肾细胞癌治疗的成年肾癌患者。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，可与 cabozantinib 联合用药，用于治疗癌症（晚期肾细胞癌）已经扩散且尚未接受晚期肾细胞癌治疗的成年肾癌患者。请阅读 cabozantinib 包装中的“患者信息”。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，用于治疗在使用其他抗癌药物后肾癌（肾细胞癌）仍已扩散或增长的成年患者。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，用于治疗头颈癌（鳞状细胞癌）已复发或扩散且已尝试过铂类药物化疗但未起作用或不再起作用的成年患者。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，用于在癌症手术之前或之后治疗泌尿道（包括膀胱、尿道、输尿管或肾盂）内膜癌 [尿路上皮癌] 已扩散或增长（局部晚期或转移），且已尝试过铂类药物化疗且未起作用或不再起作用的成年患者，或者在接受铂类药物化疗后的 12 个月内该癌症恶化的成年患者。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，用于治疗患有泌尿道（包括膀胱、输尿管或肾盂）内膜癌 [尿路上皮癌] 的成年患者，有助于防止尿路癌在手术切除后复发。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，用于治疗患有连接咽喉与胃的食管癌症（食道癌）的成年患者，用药条件为患者的食道癌是鳞状细胞癌，且不能通过手术切除，并且在接受氟嘧啶和铂类药物化疗后已经复发或扩散到身体的其他部位。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，可用于成年患者，有助于预防连接咽喉与胃的食管癌症（食道癌）或食道与胃相连处的癌症（胃食管交界处癌症）在接受化疗后再进行手术切除后复发（但在切除的肿瘤或淋巴结中仍有一些癌细胞存在）。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，可与含有氟嘧啶和铂的化疗联合使用，用于治疗患有连接咽喉和胃的食管癌症（食道癌）的成年患者。患者所患的癌是一种叫做鳞状细胞癌的类型，且无法通过手术切除（晚期）或已经扩散到身体其他部位（转移），并且患者还没有对晚期或转移性食道癌进行治疗。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，可与 YERVOY® (ipilimumab) 联合使用，用于治疗患有连接咽喉和胃的食管癌症（食道癌）的成年患者。患者所患的癌是一种叫做鳞状细胞癌的类型，且无法通过手术切除（晚期）或已经扩散到身体其他部位（转移），并且患者还没有对晚期或转移性食道癌进行治疗。

OPDIVO® (nivolumab) 是一种处方药，可与含有氟嘧啶和铂的药物化疗联合使用，用于治疗患有胃癌、胃与食道相连处的癌症（胃食管交界处癌症）和食道癌的成年患者，这种食道癌是一种叫做腺癌的类型，无法通过手术切除或已经扩散到身体其他部位。

OPDIVO 在治疗患有黑色素瘤的 12 岁以下儿童患者方面的安全性和疗效尚不明确。

尚不明确 OPDIVO 对治疗儿童其他癌症是否安全有效。

YERVOY® (ipilimumab)


YERVOY® (ipilimumab) 是一种处方药，可单独用药或联合 OPDIVO® (nivolumab) 使用，用于治疗黑色素瘤（一种皮肤癌）已扩散（转移）或无法通过手术切除（无法切除）的成年人和年满 12 岁的儿童患者。

YERVOY® (ipilimumab) 是一种用于成人的处方药，有助于防止黑色素瘤（一种皮肤癌）在手术切除肿瘤和含有肿瘤的淋巴结后复发。

尚不明确 YERVOY 对 12 岁以下的儿童是否安全有效。

Opdualag™ (nivolumab and relatlimab-rmbw)

Opdualag™ (nivolumab and relatlimab-rmbw) 是一种处方药，用于治疗患有的一种称为黑色素瘤且已扩散或无法通过手术切除的皮肤癌（晚期黑色素瘤）的成年人和年满 12 岁的儿童患者。目前尚不明确 Opdualag 用于年满 12 岁但体重低于 88 磅（40 公斤）的儿童或 12 岁以下的儿童时是否安全有效。

 请查看下一页上的“有关 OPDIVO、YERVOY 和 Opdualag 的重要安全信息”。



有关 OPDIVO® (nivolumab)、YERVOY® (ipilimumab) 以及 OPDIVO + YERVOY 的重要安全信息

有关 OPDIVO® (nivolumab)、YERVOY® (ipilimumab) 以及 OPDIVO + YERVOY 的重要安全信息

关于 OPDIVO + YERVOY, 应当了解的最重要信息是什么?

OPDIVO 和 YERVOY 是通过与免疫系统协作来治疗特定癌症的药物。OPDIVO 和 YERVOY 可能导致免疫系统攻击任意身体部位的正常器官和组织, 并可能影响其发挥作用。这些问题有时会变得严重或危及生命, 并且可能会导致死亡。这些问题可能会在治疗期间随时发生, 甚至会在治疗结束后出现。您可能会同时出现多种上述问题。当 OPDIVO 与另一种疗法联合用药时, 部分此类问题可能会出现得更频繁。

如果您出现任何新的体征或症状, 或体征或症状出现恶化, 请立即致电联系您的医护人员或就诊, 这些体征或症状可能包括:

- 肺部问题: 新发咳嗽或咳嗽恶化; 呼吸短促; 胸痛
- 肠道问题: 腹泻 (稀便) 或排便比平常频繁; 大便呈黑色、柏油状、粘稠或带血或黏液; 胃部 (腹部) 剧烈疼痛或压痛
- 肝脏问题: 皮肤或眼白发黄; 严重恶心或呕吐; 胃部 (腹部) 右侧疼痛; 尿色深 (茶色); 比平常更容易发生出血或产生淤青
- 激素分泌腺问题: 持续性或异常头痛; 眼睛畏光; 眼睛问题; 心率快; 多汗; 极度疲劳; 体重增加或减轻; 感觉比平常更容易饥饿或口渴; 排尿比平常更频繁; 脱发; 感觉寒冷; 便秘; 声音变得深沉; 头晕或昏厥; 情绪或行为改变, 如性欲减退、易怒或健忘
- 肾脏问题: 尿量减少; 尿中带血; 脚踝肿胀; 食欲不振
- 皮肤问题: 皮疹; 瘙痒; 皮肤起疱或脱皮; 口腔、鼻部、喉咙或生殖器部位疼痛或溃疡
- 眼睛问题: 复视、视力模糊或其他视力问题; 眼睛疼痛或发红

其他器官和组织也可能出现问题。这些并不是 OPDIVO 和 YERVOY 可能导致的免疫系统问题的全部体征和症状。如果出现任何新的或恶化的体征或症状, 请立即致电或联系您的医护人员, 这些体征或症状可能包括:

- 胸痛; 心律不齐; 呼吸短促; 脚踝肿胀
- 思维混乱; 嗜睡; 记忆问题; 情绪或行为变化; 脖子僵硬; 平衡问题; 四肢刺痛或麻木
- 复视; 视力模糊; 畏光; 眼睛疼痛; 视力变化

- 持续性或严重的肌肉疼痛或无力; 肌肉痉挛
- 红细胞减少; 淤青

立即进行相关治疗可能能够防止这些问题变得更严重。您的医护团队将在治疗期间检查您的这些问题, 并可能使用皮质类固醇或激素替代药物进行治疗。如果您出现了重度副作用, 您的医护团队可能需要推迟或完全停止对您的治疗。

OPDIVO 和 YERVOY 可能导致的副作用

OPDIVO 和 YERVOY 可能导致严重的副作用, 包括:

• 参见“关于 OPDIVO + YERVOY, 应当了解的最重要信息是什么?”

- 严重的输液反应。如果您在 OPDIVO 或 YERVOY 输注期间出现下列症状, 请立即告知医护团队: 寒颤或颤抖; 瘙痒或皮疹; 潮红; 呼吸短促或喘息; 头晕; 感觉要昏倒; 发热; 背部或颈部疼痛
- 使用供体干细胞 (同种异体) 进行骨髓 (干细胞) 移植的并发症, 包括移植抗宿主病 (GVHD)。此类并发症可能较为严重, 并可导致死亡。如果您在接受 OPDIVO 或 YERVOY 治疗之前或之后进行移植, 可能会发生这些并发症。您的医护人员将监测您是否出现这些并发症。

OPDIVO 单独用药时最常见的副作用包括: 感觉疲劳; 皮疹; 肌肉、骨骼和关节疼痛; 皮肤瘙痒; 腹泻; 恶心; 虚弱; 咳嗽; 呕吐; 呼吸短促; 便秘; 食欲不振; 背部疼痛; 上呼吸道感染; 发热; 头痛; 胃部 (腹部) 疼痛; 以及尿路感染。

OPDIVO 与化疗药物联合用药时最常见的副作用包括: 恶心、便秘、感觉疲劳、食欲下降和皮疹。

OPDIVO 与 YERVOY 联合用药时最常见的副作用包括: 感觉疲劳; 腹泻; 皮疹; 瘙痒; 恶心; 肌肉、骨骼和关节疼痛; 发热; 咳嗽; 食欲下降; 呕吐; 胃部 (腹部) 疼痛; 呼吸短促; 上呼吸道感染; 头痛; 甲状腺激素水平低 (甲状腺功能减退); 便秘; 体重下降; 头晕。

OPDIVO 与 YERVOY 和化疗药物联合用药时最常见的副作用包括: 感觉疲劳; 肌肉、骨骼和关节疼痛; 恶心; 腹泻; 皮疹; 食欲下降; 便秘; 以及瘙痒。

OPDIVO 与 cabozantinib 联合用药时最常见的副作用包括: 腹泻; 感觉疲劳或虚弱; 肝脏问题; 手掌或脚底出现皮疹、红肿、疼痛、肿胀或水疱; 口腔溃疡; 皮疹; 高血压; 甲状腺激素水平低; 肌肉、骨骼和关节疼痛; 食欲下降; 恶心; 味觉改变; 胃部 (腹部) 疼痛; 咳嗽; 上呼吸道感染。

 请查看下一页上的“有关 OPDIVO、YERVOY 和 Opdualag™ (nivolumab and relatlimab-rmbw) 的重要安全信息”。



有关 OPDIVO® (nivolumab)、YERVOY® (ipilimumab)、OPDIVO + YERVOY 以及 Opdualag™ (nivolumab and relatlimab-rmbw) 的重要安全信息 (续)

OPDIVO 与氟嘧啶和铂类药物化疗联合用药时, 最常见的副作用包括: 恶心; 手或脚麻木、疼痛、刺痛或烧灼感; 食欲下降; 感觉疲劳; 便秘; 口疮; 腹泻; 呕吐; 胃部 (腹部) 疼痛; 以及肌肉、骨骼和关节疼痛。

YERVOY 最常见的副作用包括: 感觉疲劳; 腹泻; 恶心; 瘙痒; 皮疹; 呕吐; 头痛; 体重减轻; 发烧; 食欲下降; 难以入睡或无法入睡。

这些并非可能会出现的全部副作用。欲了解更多信息, 请咨询您的医护人员或药剂师。建议您向 FDA 报告处方药的不良副作用。

请致电 1-800-FDA-1088。

在接受 OPDIVO 或 YERVOY 治疗前, 请告知医护人员您的所有病情, 包括您是否:

- 存在免疫系统问题, 例如克罗恩病、溃疡性结肠炎或狼疮
- 接受过器官移植
- 已经接受或打算接受使用供体干细胞 (同种异体) 的干细胞移植
- 过去曾对胸部进行放射治疗, 并曾接受过其他类似 OPDIVO 的药物
- 患有影响神经系统的疾病, 如重症肌无力或格林-巴利综合征
- 已怀孕或计划怀孕。OPDIVO 和 YERVOY 可能对胎儿有害。
- 正在哺乳或计划哺乳。尚不清楚 OPDIVO 或 YERVOY 是否会分泌到乳汁中。采用 OPDIVO 或 YERVOY 治疗期间以及 OPDIVO 最后一次用药之后 5 个月内或 YERVOY 最后一次用药之后 3 个月内请勿进行母乳喂养。

能够怀孕的女性:

在开始接受 OPDIVO 或 YERVOY 治疗之前, 医护人员应对您进行验孕。

- 您应当在 OPDIVO 或 YERVOY 给药期间以及以及 OPDIVO 最后一次给药之后 5 个月内或 YERVOY 最后一次给药之后 3 个月内使用有效的避孕方法。请向医护人员咨询在此期间您可以采用何种避孕方法。
- 如果您在接受 OPDIVO 或 YERVOY 治疗期间怀孕, 或者认为您可能已怀孕, 请立即告诉医护人员。一旦发现怀孕, 您或您的医护人员应立即致电 1-844-593-7869 与 Bristol Myers Squibb 公司联系。

将您服用的所有药物都告诉医护人员, 包括处方药和非处方药、维生素和中药药补充剂。

有关 Opdualag (nivolumab and relatlimab-rmbw) 的重要安全信息

关于 Opdualag, 应当了解的最重要信息是什么?

Opdualag 是一种可能可以通过与免疫系统协作来治疗一种叫做黑色素瘤的皮肤癌的药物。Opdualag 可能导致免疫系统攻击任意身体部位的正常器官和组织, 并可能影响其发挥作用。这些问题有时会变得严重或可能导致死亡。这些问题可能会在治疗期间随时发生, 甚至会在治疗结束后出现。您可能会同时出现多种上述问题。

如果您出现任何新的体征或症状, 或体征或症状出现恶化, 请立即致电联系您的医护人员或就诊, 这些体征或症状可能包括:

- **肺部问题:** 新发咳嗽或咳嗽恶化; 呼吸短促; 胸痛
- **肠道问题:** 腹泻 (稀便) 或排便比平常频繁; 大便呈黑色、柏油状、粘稠或带血或黏液; 胃部 (腹部) 剧烈疼痛或压痛
- **肝脏问题:** 皮肤或眼白发黄; 严重恶心或呕吐; 胃部 (腹部) 右侧疼痛; 尿色深 (茶色); 比平常更容易发生出血或产生淤青
- **激素分泌腺问题:** 持续性或异常头痛; 眼睛畏光; 眼睛问题; 心率快; 多汗; 极度疲劳; 体重增加或减轻; 感觉比平常更容易饥饿或口渴; 排尿比平常更频繁; 脱发; 感觉寒冷; 便秘; 声音变得深沉; 头晕或昏厥; 情绪或行为改变, 如性欲减退、易怒或健忘
- **肾脏问题:** 尿量减少; 尿中带血; 脚踝肿胀; 食欲不振
- **皮肤问题:** 皮疹; 瘙痒; 皮肤起疱或脱皮; 口腔、鼻部、喉咙或生殖器官部位疼痛或溃疡
- **心脏问题:** 新发胸痛或胸痛加重; 心律不齐或感觉心跳加速; 呼吸短促; 疲劳; 脚踝肿胀

其他器官和组织也可能出现问题。这些并不是使用 Opdualag 时可能出现的免疫系统问题的所有体征和症状。如果出现任何新的或恶化的体征或症状, 请立即致电或联系您的医护人员, 这些体征或症状可能包括:


- 思维混乱; 嗜睡; 记忆问题; 情绪或行为变化; 脖子僵硬; 平衡问题; 四肢刺痛或麻木
- 复视; 视力模糊; 畏光; 眼睛疼痛; 视力变化
- 持续性或严重的肌肉疼痛或无力; 肌肉痉挛
- 红细胞减少; 淤青

立即进行相关治疗可能能够防止这些问题变得更严重。在使用 Opdualag 治疗期间您的医护团队会核实您是否存在这些问题。您的医护人员可能会使用皮质类固醇或激素替代药物治疗。如果您出现了严重副作用, 您的医护人员可能需要推迟或完全停止 Opdualag 的治疗。

Opdualag 可能会产生的副作用

Opdualag 可能会产生严重的副作用, 包括:

- 参见“关于 Opdualag, 应当了解的最重要信息是什么?”
- 严重的输液反应。如果您在 Opdualag 输注期间出现下列症状, 请立即告知医护人员或护士: 寒颤或颤抖; 瘙痒或皮疹; 潮红; 呼吸短促; 头晕; 感觉要昏倒; 发热; 背部或颈部疼痛

 请查看下一页上的“有关 OPDIVO、YERVOY 和 Opdualag 的重要安全信息”。



有关 OPDIVO® (nivolumab)、YERVOY® (ipilimumab)、OPDIVO + YERVOY 以及 Opdualag™ (nivolumab and relatlimab-rmbw) 的重要安全信息 (续)

- 使用供体干细胞 (同种异体) 进行干细胞移植的并发症。此类并发症可能较为严重, 并可导致死亡。如果您在接受 Opdualag 治疗之前或之后进行移植, 可能会发生这些并发症。如果您接受了异体干细胞移植, 您的医护人员将监测您是否出现并发症的体征。

Opdualag 治疗最常见的副作用包括:

肌肉和骨骼疼痛; 疲劳; 红血球和白血球计数减少; 肝功能检查结果偏高; 皮疹; 瘙痒, 腹泻; 血液中的盐 (钠) 浓度降低。

这些并非 Opdualag 可能会产生的全部副作用。请联系医生寻求副作用方面的医疗建议。您可以拨打 1-800-FDA-1088 向 FDA 报告副作用。

如果您有下列情况, 在接受 Opdualag 治疗之前, 请告诉医护人员:

- 存在免疫系统问题, 例如克罗恩病、溃疡性结肠炎或狼疮
- 接受过器官移植
- 已经接受或打算接受使用供体干细胞 (同种异体) 的干细胞移植
- 患有影响神经系统的疾病, 如重症肌无力或格林-巴利综合征
- 已怀孕或计划怀孕。Opdualag 可能对胎儿有害

能够怀孕的女性

- 在开始接受 Opdualag 治疗之前, 医护人员应对您进行验孕
 - 您应当在 Opdualag 用药期间以及末次用药后至少 5 个月内使用有效的避孕方法。请向医护人员咨询在此时间您可以采用何种避孕方法
 - 如果您在 Opdualag 治疗期间怀孕, 请立即告诉医护人员
- 正在哺乳或计划哺乳。尚不清楚 Opdualag 是否会分泌到乳汁中。在 Opdualag 治疗期间和 Opdualag 末次用药后 5 个月内切勿进行母乳喂养

将您服用的所有药物都告诉医护人员, 包括处方药和非处方药、维生素和中草药补充剂。





请参阅第 2-5 页上的“有关 OPDIVO、YERVOY 和 Opdualag 的重要安全信息”, 以及“针对 OPDIVO、YERVOY 和 Opdualag 的美国完整处方信息和用药指南”。



查看我们的教育资源，按自己的进度安排学习

访问 www.Immuno-OncologyTeach.com

✓在学习期间检查您的学习进度再继续。



为您和您的患者实时按需提供支持服务

我们随时帮助您更好地了解您的药物治疗。这些计划的实施对象为开具了 **OPDIVO® (nivolumab)** 或 **Opdualag™ (nivolumab and relatlimab-rmbw)** 处方药物的患者及其亲人。不到 5 分钟即可完成注册。**Bristol Myers Squibb** 承诺在 24 小时内回应您的需求。

OPDIVO with You
(nivolumab)
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL



1-855-OPDIVO-1
(1-855-673-4861)

获取实时支持和协助 星期一至星期五，
上午 8:00 至晚上 8:00 (美国东部时间)

回应时间 星期一至星期五，
上午 8:00 至晚上 8:00 (美国东部时间)

- 实用信息
- 关于支持小组和倡导小组的详细信息

可以在 www.opdivo.com
网站上找到这些支持资源和其他资源

Opdualag with You
(nivolumab and relatlimab-rmbw)
Injection for intravenous use | 480 mg/160 mg

i 实用信息

获得实用提示、工具和教育材料，帮助您或您的亲人详细了解 Opdualag，也可能有助于支持您的治疗。

支持小组和倡导小组

我们可以指导您找到相关机构，从而帮助您克服可能要面临的挑战。

只需拨打 1-855-OPDUALAG (1-855-673-8252)
星期一至星期五，上午 8:00 至晚上 8:00 (美国东部时间)

可以在 www.Opdualag.com
网站上找到这些支持资源和其他资源

i 请查看*第2-5页上的“有关 OPDIVO、YERVOY (ipilimumab) 和 Opdualag 的重要安全信息”以及“针对 OPDIVO、YERVOY 和 Opdualag 的美国完整处方信息和用药指南”。

Bristol Myers Squibb®

© 2024 Bristol-Myers Squibb Company.
OPDIVO®、YERVOY®、Opdualag™、Immuno-Oncology Teach™
及相关标志是 Bristol-Myers Squibb Company
的商标。 7356-US-2400020 02/24

OPDIVO
(nivolumab)
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL

OPDIVO + YERVOY
(nivolumab + ipilimumab)

YERVOY
(ipilimumab)
Injection for intravenous infusion

Opdualag
(nivolumab and relatlimab-rmbw)
Injection for intravenous use | 480 mg/160 mg